

VAŽNE INFORMACIJE PRI POLASKU U VRTIĆ

CIJEPLJENJE:

Dijete mora biti cijepljeno svim cjepivima predviđenima za dob po Kalendaru obveznog cijepljenja u RH.

- U slučaju odgode cijepljenja, roditelj mora dostaviti potvrdu pedijatra o razlozima odgode te planiranom datumu primjene cjepiva.
- Iznimka od ovog pravila su rijetki slučajevi postojanja trajne kontraindikacije za cijepljenje, za koje mora postojati medicinska dokumentacija.
- Dobrom procijepljenošću u zajednici zaštićena su i djeca koja imaju kontraindikaciju za cijepljenje (privremenu ili trajnu).

Vrtić ima pravo i obvezu redovito tražiti na uvid cijepnu iskaznicu djeteta !

BOLESTI DJECE:

Svako dijete s povišenom tjelesnom temperaturom, probavnim tegobama unutar 24 sata, osipom i kožnim promjenama koje mogu biti znakom zarazne bolesti, ušljivosti glave, upalom sluznice oka (konjunktivitisom) i zarazom dječjim glistama treba ostaviti kod kuće i javiti se izabranom pedijatru.

- dijete može pohađati vrtić samo ukoliko je afebrilno (normalne tjelesne temperature) BEZ primjene antipiretika (lijekova za snižavanje temperature) posljednja 24 sata.
- bolesna djeca predstavljaju izvor zaraze za drugu, zdravu djecu u kolektivu, a i sama su osjetljivija na uzročnike drugih bolesti, što samo može produljiti vrijeme izostanka djeteta iz kolektiva.

Za svako dijete s navedenim simptomima odgojitelj je dužan pozvati roditelja da dođe po dijete !

IZOSTANCI:

Svaki izostanak zbog bolesti potrebno je opravdati liječničkom ispričnicom te se držati preporuka pedijatra o propisanoj terapiji i duljini izostanka iz kolektiva. Iznimno, roditelj može opravdati izostanak zbog blage, samoograničavajuće bolesti (koja traje do tri dana i ne zahtijeva pregled liječnika).

- Dijete koje je oboljelo od crijevne viroze može biti zarazno i nakon prestanka simptoma, stoga se ono smije vratiti u vrtić tek 48 sati (puna 2 dana), nakon što su SVI simptomi (proljev i povraćanje) u potpunosti prestali.

PREVENCIJA BOLESTI:

- Naučiti djecu pravilno prati ruke sapunom i vodom, posebice nakon nužde i prije jela.
- Održavati nokte sasvim podrezanima.
- Tijekom prehlade, održavati higijenu nosa fiziološkom otopinom.
- Upozoravati na nepoželjna ponašanja (kihanje/kašljanje prema drugoj osobi, dodirivanje lica i sluznica rukama...).
- Izbjegavati korištenje plišanih/tekstilnih igračaka.
- Održavati higijenu prostora i često prozračivati isti.