

Streptokokne bolesti

○ uzročnik je bakterija *Streptococcus pyogenes*

○ kod djece najčešće uzrokuje:

STREPTOKOKNU ANGINU

- Jaka bol u grlu (posebno pri gutanju), visoka temperatura, opća slabost i natečeni limfni čvorovi na vratu.
- Karakteristično **BEZ** drugih simptoma, poput kašlja i curenja nosa.

ŠARLAH

- Visoka temperatura praćena glavoboljom, grloboljom, često crvenilo obraza, blijedilo oko usta, crven i zrnat jezik (malinasti).
- Osip koji se širi od vrata prema prsima i ostatku tijela, a **NE** zahvaća lice, dlanove ni tabane.

○ Dijagnoza se postavlja prilikom **liječničkog pregleda** (tipični simptomi), potvrđuje se uzimanjem brisa grla, iako nije uvijek nužan za postavljanje dijagnoze.

○ Liječi se antibioticima koji se moraju popiti do kraja.

KLICONOŠTVO - dio djece u grlu ima streptokok, ali nemaju simptome bolesti. To je uobičajena pojava, posebice tijekom hladnijeg dijela godine. Kliconoše ne treba liječiti antibioticima niti je potrebno uzimati bris djeci koja nemaju simptome!

○ Kada se u vrtiću u kratkom vremenu razboli više djece (potvrđeni laboratorijski i s pravom kliničkom slikom angine ili šarlaha), preporučuje se uzimanje antibiotika (tzv. kemoprofilaksa) svoj djeci i odgojiteljima te skupine, kako bi se prekinulo širenje zaraze i ponavljanje bolesti. **Nije potrebno prethodno u grupi uzimati briseve grla!**

Odluku i preporuku za kemoprofilaksu donosi isključivo epidemiolog!

KAKO SPRIJEČITI ŠIRENJE ZARAZE?

- Djecu koja imaju simptome bolesti **NE DOVODITI** u vrtić sve do izlječenja.
- Redovito **ČISTITI I PROVJETRAVATI** PROSTORIJE u kojima djeca borave.
- **PRATI RUKE** temeljito vodom i sapunom, posebice nakon brisanja nosa i kontakta sa slinom.
- Izbjegavati dodirivanje lica rukama.
- Učiti djecu da prilikom kihanja kihnu u vlastiti lakat ili u maramicu.
- Učiti djecu da ne dijele pribor za jelo i piće.